



أسماء الأدوية ذات التأثير
الضار على العصب السمعي

وحدة السمع والأتزان

Medications That Has
Harmful Effects on Your Ears
(Ototoxic)

Audio - Vestibular Unit



1- ANTIBIOTICS:

- Gentamycin (Garamycin)
- Streptomycin
- Kanamycin (Kanatrex)
- Amikacin (Amikin)
- Neomycin (Mycifradin)
- Tobramycin (Nebcin)
- Netilmicin (Netromycin)
- Dihydrostreptomycin (either intramuscular injection or ear drops)
- Erythromycin (in high doses only)
- Vancomycin (Vancocin) (in high doses only)

2- Salicylates (Aspirin)

(in high doses only)

3-Ibuprofen

(Mortin-Nuprin- Advil- Midol)

4-Loop Diuretic

- Ethacrynic acid (Edecrin)
- Sodium Ethacrylate (Edecrin sodium)
- Furosemide (Lasix)

5- Anti-Cancer Drugs:

- Cisplatin (PLATINOL)
- Carboplatin (PARAPLATIN)

6- Anti-Malarial Drug

- Chloroquine, Hydroxy Chloroquine

7- Quinidine, Quinine

These Medications shouldn't be taken (if other effective medicine is available) especially in these cases:

- Pre-existing hearing loss
- Impaired Kidney function
- Old Age

If it is a must, you have to take care of:

- Do not take high (unnecessary) doses of the medicine.
- Do hearing evaluation before, during and after the treatment.
- Consult your doctor if you noticed tinnitus, hearing loss or dizziness.

DO NOT EXPOSE YOUR EARS TO HIGH NOISE UNLESS YOU WEAR EAR PROTECTORS.

أولاً: المضادات الحيوية مثل:

- جينتاميسين (جاراميسين)
- ستربتوميسين
- كاناميسين (كانتريكس)
- أميكاسين (أميكين)
- نيوميسين (مايسيفرادين)
- توبراميسين (نيسين)
- نيتلمايسين (نيتروميسين)
- دا يهيدروستر بيتوميسين (سواء كان حقن أو قطرة بالأذن)
- إيريثروميسين (في الجرعات العالية فقط)
- فانكوميسين (فانكوسين) (في الجرعات العالية فقط)

ثانياً: الأسبرين والأدوية التي تحتوي على حمض الساليسيليك

(في الجرعات العالية فقط)

ثالثاً: بعض المسكنات مثل ايبوبروفين

(مورتين - نابرين - أدفيل - ميدول)

رابعاً: مدرات البول مثل:

- حمض الأيثاكرينيك (ايدكرين)
- ايثاكريينات الصوديوم (ايدكرين الصوديوم)
- فيوروزيميد (لازيكس)

خامساً: أدوية علاج الأورام السرطانية مثل:

- سيز بلاتينام (بلاتينول)
- كاربوبلاتين (بارا/بلاتين)

سادساً: أدوية علاج الملاريا مثل:

- كلوروكين
- هيدروكسي كلوروكين

سابعاً: الكينين والكينيدين

ينصح بعدم استعمال هذه الأدوية (إذا توفر البديل الفعال) وخصوصاً في الحالات الآتية:

- المرضى الذين يعانون من ضعف العصب السمعي
- مرضى القصور الكلوي
- كبار السن

وفي حال وجوب استعمال هذه الأدوية ينصح بالآتي:

- عدم تعاطي جرعات عالية زائدة عن الحاجة.
- عمل تخطيط للسمع قبل وأثناء وبعد استعمال الدواء.
- مراجعة الطبيب في حالة ظهور طنين بالأذن أو ضعف بالسمع أو شعور بالدوار.

ملحوظة هامة : يجب عدم التعرض للضوضاء العالية إلا باستخدام واقيات للأذنين